

Duplicate

0 25 '32
Lane Medical Library

Aus der Universitäts-Frauenklinik Hamburg-Eppendorf
(Professor Dr. Th. Heynemann)

Lebensbedrohliche Menorrhagien bei essentieller Thrombopenie

Inaugural-Dissertation

zur Erlangung
der medizinischen Doktorwürde
einer
Hohen medizinischen Fakultät der
Universität Hamburg

vorgelegt von

Heinz Bulle

aus Cuxhaven

Juni 1931

Gedruckt
im Tageblatt-Haus Coburg
1931

Menorrhagien bei Frauen im ersten Jahrzehnt ihres menstruellen Zyklus haben im allgemeinen ihre Ursache in Veränderungen im Bereiche der Genitalien. In anderen aber ist die Ursache in internen Erkrankungen zu suchen. Herzerkrankungen können durch venöse Stauung Menorrhagien hervorrufen. Auch endokrine Störungen, z. B. Schilddrüsenerkrankungen, können dazu führen. Als seltene Ursachen kommen auch zwei Erkrankungen in Betracht, die wegen ihrer Seltenheit und ihrer wenig typischen Symptomatik erst nach längerer Beobachtung erkannt werden. Das ist einmal die als Blutungsursache selten wahrgenommene Anämia perniciosa, dann die Gruppe der haemorrhagischen Diathesen, von denen nur die essentielle Thrombopenie als Ursache von Genitalblutungen gesehen zu werden pflegt. Gerade die essentielle Thrombopenie führt bei adolescenten Mädchen relativ häufig zu geringeren oder stärkeren Menorrhagien. Jedoch wird in einem großen Teil der Fälle wegen der Gutartigkeit des Verlaufs die eigentliche Aetiologie des Leidens nicht erkannt, da häufig nach kürzerer oder längerer Zeit spontane Besserung eintritt. Auch kann zu gewissen Zeiten eine Genitalblutung das einzige Symptom einer bestehenden Thrombopenie sein, die dann nur erkannt wird, wenn die Erkrankung ernstere Formen annimmt und die Patientinnen über eine längere Zeit in Behandlung bleiben.

Die Wichtigkeit einer genauen Diagnosenstellung aber ergibt sich daraus, daß wir es in der Hand haben, in Fällen von essentieller Thrombopenie schwerste Blutungserscheinungen in der Mehrzahl der Fälle beheben zu können und in manchen Fällen lebensrettend eingreifen zu können. An Hand eines Falles, bei dem durch eine Splenektomie lebensbedrohliche Genitalblutungen sistieren, möchte ich auf einige Punkte der Werlhof'schen Krankheit eingehen, die die Ursache jener Blutungen gewesen ist.

Es handelt sich um ein 19jähriges Mädchen, das bisher als Hausangestellte tätig gewesen ist und folgende Angaben über ihre Familie, über frühere Krankheiten und über ihre jetzige Erkrankung macht.

Beide Eltern und eine Schwester sind gesund. Auch in der weiteren Verwandtschaft ist kein Fall einer Erkrankung nachweisbar, dem eine familiäre und hereditäre Bedeutung zukommt.

Als Kind hat die Kranke eine Diphtherie durchgemacht, danach soll angeblich ein Herzfehler festgestellt sein. Auch eine Rippenfell-

entzündung ist überstanden. Ungefähr im 12. Lebensjahr treten häufiger Nasen- und Zahnfleischblutungen auf, letztere besonders stark, sodaß sich danach eine stärkere Blässe eingestellt hat. Auffällig ist, daß die Pat. nach kleinen „Stößen und Puffen große blaue Flecken bekommt, was dann zur Belustigung ihrer Spielkameraden Veranlassung gibt.“

Menarche mit 15 Jahren, zuerst einige Monate unregelmäßig, dann oft regelmäßig, alle 3—4 Wochen, ca. 5—7 Tage anhaltend. Es haben also für die Pubertät in Stärke und Dauer keine ungewöhnlichen Blutungen bestanden. Eine auffällige Aenderung tritt im Alter von 17 Jahren ein. Wohl menstruiert die Pat. nicht häufiger als früher, jedoch werden die Monatsblutungen derartig profus und verlängert, daß zwischen zwei aufeinander folgenden Perioden ein blutungsfreies Intervall von wenigen Tagen liegt und die Patientin, durch die hohen Blutverluste geschwächt, einen besorgniserregenden Grad von sekundärer Anaemie darbietet. Sie wird deswegen von dem behandelnden Hausarzt in ein Krankenhaus eingewiesen. Ein Bericht des behandelnden Arztes schildert den damaligen Zustand und den Verlauf folgendermaßen:

„Ich habe die Patientin wegen Menorrhagien in meiner Behandlung gehabt und sie damals, als nach achttägiger Behandlung die Blutung nicht stand, in eine Klinik geschickt, wo eine Abrasio gemacht wurde. Die nächsten Menfes waren aber wieder so profus, daß der Zustand direkt bedrohlich war. Ich habe, nachdem Styptika sich als nutzlos erwiesen, den Uterus mit Claudengaze tamponiert und auch Clauden injiziert. Der Haemoglobingehalt des Blutes war unterdessen auf 30 Prozent, die Erythrocyten auf knapp 1 000 000 heruntergegangen. Da ich der Ueberzeugung war, daß es sich nicht um eine Genitalkrankung, sondern um eine endokrine Störung handelte, machte ich auch, allerdings ohne Erfolg, einen Versuch mit Calcophylin. Ich habe zuletzt die Patientin mit Leber gefüttert, Arfen injiziert und als sie unter dieser Behandlung allmählich marschfähig geworden war, eine Höhensonnenkur angeschlossen. Bei den Menfes war zuerst noch die Verabreichung von Clauden per os notwendig und von Erfolg begleitet. Bei Abschluß der Behandlung war Blutfarbstoff und Erythrocytenwert normal. Der behandelnde Frauenarzt wollte zunächst durchaus auf einen Abort hinaus, für den sich aber auch mikroskopisch kein Anhaltspunkt ergab (normale Schleimhaut). Ich habe von vornherein nicht an einen Abort geglaubt, da sie virgo intacta war.“

Nach Entlassung aus der Behandlung des Hausarztes sind die Blutungen noch erheblich verstärkt und verlängert. Patientin fühlt sich

trotzdem arbeitsfähig und will auch eine frische Gesichtsfarbe geboten haben. Sie nimmt eine Stelle als Hausangestellte an und kommt so im September 1928 nach Hamburg. Sie muß sich jedoch schon wieder im November 1928 wegen erneuter starker Monatsblutungen in ärztliche Behandlung begeben und erhält die üblichen gynäkologischen Styptika. Eine weitere Verschlimmerung tritt im Februar ein. Es setzen, genau wie früher, stärkste Menorrhagien ein, die wieder nur zu kurzen blutungsfreien Intervallen Zeit lassen. Als die Pat. am 16. Mai 1929 in der Universitäts-Frauenklinik Eppendorf zur Aufnahme kommt, hat sie fortgesetzt vier Wochen lang geblutet. Ähnlich wie im 12. Lebensjahr hat Pat. auch im 17. Lebensjahr an Nasen- und Zahnfleischblutungen gelitten. Auffälligerweise setzt das Nasenbluten stets dann ein, wenn die menstruelle Blutung zum Stehen gekommen ist. Die Zahnfleischblutungen erfolgen stets, ohne daß ein für die Pat. ursächlicher Zusammenhang zu ermitteln ist, und stellen sich meistens nachts ein; Pat. bemerkt dann beim Erwachen an den Zahnreihen flächenhafte Beläge geronnenen Blutes.

Außer den die Pat. bedrückenden verstärkten Blutungserscheinungen und allgemeinen Beschwerden, wie starken Kopfschmerzen, Herzklopfen, Schlaflosigkeit und Mattigkeit, können andere Beschwerden nicht angegeben werden. Stuhl und Urin werden stets in normaler Weise entleert und haben nie eine Verfärbung im Sinne blutiger Beimengungen geboten.

Befund: 19jähriges mittelgroßes Mädchen von 58,5 kg Körpergewicht, von grazilem Körperbau und genügendem Kräfte- und Ernährungszustand. Hochgradige Blässe der Haut und sichtbaren Schleimhäute, der ein Hb.-Gehalt von 26 Prozent und eine Erythrocytenzahl von 2,200,000 und ein Farbeindex von 0,58 entspricht. Geringe Unterentwicklung der sekundären Geschlechtsmerkmale: schwach entwickelte Mammæ, spärliche Behaarung am Mons veneris und in den Achseln. Weiter bietet Pat. einen müden und etwas ängstlichen Gesichtsausdruck. Nirgends Drüenschwellungen. Fettpolster und Muskulatur genügend entwickelt. Guter Turgor der Gewebe.

An den Bewegungsorganen kein krankhafter Befund. Insbesondere an den Gelenken nichts Auffälliges: keine Gelenkblutungen, auch nach Provokation. Keine Druck- und Stoßempfindlichkeit der Gelenke. Keine Oedeme. Trotz Abtasten der Körperoberfläche nirgends eine auch nur petechiale Blutung zu erspüren. Temperaturen anfangs subfebril, rektal gemessen, höchste Temperatur 38,3°.

An der Nasenschleimhaut keine Zeichen einer Blutung jetzt nachweisbar. Keine okulo-pupillären Störungen. Am Augenhintergrund keine Blutungen nachweisbar. Bei der ersten Untersuchung

kann eine leichte Blutung aus dem Zahnfleisch konstatiert werden, später ist nie eine solche wieder beobachtet worden. Am Hals eine Tracheotomienarbe.

Am Herzen findet sich ein systolisches Geräusch über allen Ostien, das als ein anaemisches gedeutet wird, wenn es auch über der Mitrals am stärksten ist. Herztöne dumpf, paukend. Keine perkutorische Verbreiterung des Herzens. Aktion regelmäßig. Pulszahl hält sich um 100. RR. 110 : 52. Spitzenstoß nicht verbreitert im 5. I. C. R. und schleudernd. Bei normal gewölbtem Thorax ist die Atmungsfrequenz mäßig erhöht. Untere Lungengrenzen an normaler Stelle sind gut verschieblich. Ueberall voller Klopfeschall bei reinem Bläsehenatmen. Kein Auswurf.

Das Abdomen zeigt eine genügende Entwicklung des Fettpolsters, ist überall weich und gut eindrückbar. Nirgends eine Druckempfindlichkeit oder eine Resistenz. Leber nicht palpabel. Deutlich tritt ein stumpfkantiger, derber Milztumor in Erscheinung, der gut um drei Querfinger der unteren Rippenbogen überragt und auch perkutorisch nach oben als vergrößert nachweisbar ist. Mittelstarke genitale Blutung. Gynäkologische Untersuchung: Hypoplastischer Uterus in Anteflexion und Retroposition. Die Messung mit der Sonde ergibt eine Uteruslänge von $8\frac{1}{2}$ cm. An den Anhängen weder eine Tumorbildung noch andere Veränderungen erkennbar. Die Untersuchung des Urins ergibt keinen in chemischer und morphologischer Beziehung von der Norm abweichenden Befund. Nervensystem o. B. Plychisch nach Abzug der durch die bedrohliche Art der Erkrankung bedingten Aufregung nichts Auffälliges. — Stuhl- und Urinuntersuchungen auf Sanguis bleiben negativ.

Es liegt auf der Hand, daß eine präzise Diagnose nicht gleich hat gestellt werden können. Es ist auch zu berücksichtigen, daß die Vorgeschichte, die jetzt vorliegt, erst im Laufe mehrerer Tage von der schwerkranken Patientin und nach Einholung eines ärztlichen Berichts in der jetzt bestehenden Form hat erhoben werden können.

In der Annahme, daß hier ein Fall ausgesprochener Hypertrophie der Uteruschleimhaut Ursache der Blutungen sei, ist, wie auch sonst bei schweren Blutungen ohne pathologischen Palpationsbefund an den Genitalien, eine Abrasio in Aethernarkose, und zwar am Tage nach der Aufnahme vorgenommen. Dadurch hat zunächst einmal eine Stillung der Blutung und die Möglichkeit einer histologischen Untersuchung der Uterus mucosa erreicht werden sollen. Ein Augenblickserfolg ist auch erzielt worden. Am nächsten Tage und für die folgenden Tage sind die Blutungen ausgeblieben. Die Untersuchung der Uteruschleimhaut zeigt jedoch, daß es sich nicht um die gewöhn-

liche Ursache von Pubertätsmenorrhagien handelt. Es findet sich mikroskopisch nur eine leichte Hyperplasia endometrii. Durch derartig geringe Veränderungen der Uterusf Schleimhaut haben sich so profuse Genitalblutungen nicht erklären lassen. Eine weitere Ursache für die Blutung lassen aber weder die mikroskopische Untersuchung der Uterus mucosa noch die Untersuchungsbeobachtungen während der Curettage erkennen. Ausgeschlossen werden also Myomblutungen, Placentarreste, maligne Tumoren, entzündliche Veränderungen am Genitale und Verletzungen.

Es muß also eine andere Ursache für die Blutung ermittelt werden, und zwar muß diese Ursache außerhalb des Uterus und der Ovarien aufgesucht werden.

Eine Entscheidung drängt um so mehr, als nach einem blutungsfreien Stadium von zehn Tagen anscheinend mit Beginn einer neuen Periode erneut foudroyante Blutungen einsetzen, trotzdem die Pat. in der Zwischenzeit reichlich Sekale und Ephetonin erhalten hat. In dem angefertigten Blutstatus findet sich außer allen Anzeichen einer schweren sekundären Anaemie kein bemerkenswerter Befund. Das Endothelsymptom nach Rumpel-Leede ist negativ. Es fällt jedoch auf, daß das zur Wassermann'schen Reaktion in einem Reagenzglas aufgefangene Blut keine Neigung zeigt, Serum abzapressen und damit in auffälligem Gegensatz zu anderen unter gleichen Bedingungen abgenommenen Blutmengen steht, die von den am gleichen Tage aufgenommenen anderen Patientinnen stammen. Es ist also das Symptom der mangelhaften Retraktivität des Blutkuchens, das auf einem Fehlen der Thrombocyten im entnommenen Blut beruht, gewonnen worden.

Trotzdem nun die verschiedensten therapeutischen Maßnahmen zur Anwendung kommen, gelingt es nicht, die schweren Genitalblutungen abzuschwächen, geschweige denn, zu stillen. Gebraucht werden die allgemein üblichen gynäkologischen Styptica: Extractum secale cornutum, Ergotin-Injektionen, Hypophen-Injektionen, Gynergen-Injektionen, ferner, ausgehend von dem Gedanken an eine haemorrhagische Diathese, Ephetonin, Solarfon, Kalzan und Nateina. Es ist auch nicht der geringste Erfolg zu erkennen.

Inzwischen ist unter Berücksichtigung aller anamnestischen Angaben und der hier anfangs noch beobachteten Zahnfleischblutungen, dem erheblichen Milztumor und anderen später noch zu erwähnenden Untersuchungsergebnissen die Diagnose einer essentiellen Thrombopenie gestellt. Weitere Blutausstriche haben einen erheblichen Mangel an Thrombocyten ergeben. Die nach der Methode Fonio angestellte Zählung der Thrombocyten zeitigt extrem niedrige Werte

in Höhe von 10—20,000. Die fortlaufende Verfolgung dieser Werte ergibt weiterhin ein Herabsinken bis auf 1000 absolut (relativ 2:1000). Die Spezifizierung der wenigen Exemplare zeigt, daß es sich um Riefenplättchen handelt, in deren Protoplasma, das ein homogenes Aussehen angenommen hat, Azurgranula nicht zu erblicken sind.

Nunmehr gelangen Bluttransfusionen in Mengen von 500 ccm unter Hinzufügung von Kochsalzlösungen zur Anwendung. Die Bluttransfusionen werden von der Pat. stets gut vertragen, ohne daß eine Reaktion der Empfängerin mit Temperaturanstieg und Schockerscheinungen beobachtet ist. Die chemische Untersuchung des Urins zeigt dann auch stets ein Freibleiben von Blutfarbstoff oder Blutfarbstoffderivaten. Transfundiert sind in einem Zeitraum von 24 Tagen insgesamt 3050 ccm Reinblut in fünf Einzelübertragungen. Diese Blutübertragungen — stets von gruppengleichen Spendern — sind ausgeführt einmal, um dadurch eine Umstimmung im Krankheitsgeschehen der Pat., wie es E. Frank mehrfach gesehen hat, zu erwirken, besonders aber, um den rapid absinkenden Haemoglobingehalt der Pat. zu stützen und die Pat. vor der sonst zu erwartenden Ausblutung zu bewahren. Es gelingt auch, den Haemoglobingehalt vorübergehend um einige Grade zu steigern, eine Besserung der Genitalblutungen, die man sich hier als Blutflüsse vorstellen kann, tritt jedoch nicht ein. Ebenso wirkungslos ist eine zweimalige Röntgenbestrahlung der Milz mit hohen H. E. D.-Dosen.

Nach Fehlschlagen der konservativen-expektativen Behandlung unter Einschluß von Bluttransfusion und Milzbestrahlungen ist eine zweite vorsichtige Abrasio ausgeführt, die um so mehr berechtigt gewesen ist, als ja beim ersten Male hierdurch ein Sistieren der Blutung erzielt ist. Auch diesmal ist dieser Eingriff, dem eine ausgiebige Jodätzung des Uteruscavums angeschlossen wird, von Erfolg gekrönt. Trotzdem bei der Abrasio nur wenig atrophisches Endometrium gewonnen wird, bleibt die Pat., die 32 Tage ohne Unterbrechung geblutet hat, für die nächste Zeit von jeder Genitalblutung verschont.

Inzwischen ist auch der Frage eingreifender Maßnahmen zur endgültigen Stillung der Uterusblutung näher getreten. An drei Möglichkeiten ist gedacht: Röntgenbestrahlung der Ovarien, Exstirpation oder Amputation des Uterus und Exstirpation der Milz.

Nun setzt aber an Stelle der nach der zweiten Abrasio zum Stehen gekommenen Uterusblutung ein Nasenbluten ein, das den Zustand ebenfalls in kurzer Zeit zu einem lebensbedrohlichen macht. Durch keine Maßnahme gelingt es dem zugezogenen Facharzt, die durch die Tramponaden nach außen und in den Nasenrachenraum

hindurchfickernden Blutungen zu stillen. Das dann von Zeit zu Zeit aus dem Nasenrachenraum herauskommende Blut erscheint schwach rötlich gefärbt und gerinnt zu gelatinösen, fast durchsichtigen Blutklumpen. Der Haemoglobingehalt des Blutes ist schon vorübergehend auf 13 Prozent herabgesunken und nur durch weitere Bluttransfusionen auf 20 Prozent gebracht, die Zahl der Erythrocyten ist auf 1,190,000 herabgesunken.

Es muß etwas geschehen, das das Uebel an der Wurzel anpackt. Zahlreiche Medikamente haben die Blutungen nicht beheben können. Bluttransfusionen und Milzbestrahlungen, in anderen Fällen von Morbus Werlhof als von Erfolg gekrönt erwähnt, haben das Krankheitsbild dem Wesen nach nicht beeinflußt. Von den oben erwähnten drei tiefer eingreifenden Maßnahmen bleibt nach dem Wechsel des Blutungsherdes die Milzexstirpation als einzige Möglichkeit übrig.

35 Tage hat der Pat. unaufhörlich seit Beginn der zweiten Periode geblutet, und nur durch Blutübertragung ist es möglich gewesen, das dahinschwindende Leben zu erhalten. Nur ein Eingriff, der mit der essentiellen Thrombopenie in kausalem Konnex steht, kann Wandlung schaffen. Die Milzexstirpation, sonst ein relativ einfacher Eingriff, hier ein therapeutisches Wagnis, wird beschlossen.

Als Operationsvorbereitung wird zunächst durch zwei Bluttransfusionen an zwei aufeinanderfolgenden Tagen der Hb.-Gehalt auf 20 Prozent gebracht. In Bereitschaft gehalten wird eine vorher ausgesuchte, gruppenpassende Spenderin, Assistentz und Apparatur zu einer unter Umständen nach der Operation erneut benötigten Bluttransfusion.

Die Operation wird in Aethernarkose ausgeführt (Prof. Haselhorst). Sie ist nur erfolgreich durchzuführen, wenn der Blutverlust auf ein Minimum einzuschränken ist, eine schwer erfüllbare Forderung bei einem Falle, bei dem die Blutstillung aus oberflächlichen zwecks Blutuntersuchung gemachten Stichverletzungen bereits jedesmal Schwierigkeiten bereitet. Es werden nach Markierung des Hautschnittes parallel dem linken Rippenbogen zwei Reihen von fortlaufenden Steppnähten mit dicker Seide durch die ganze Dicke der Bauchdecken gelegt und dazwischen die Bauchdecken durchtrennt, wie es bei der Schädeltrepanation gebräuchlich ist, ein Verfahren, daß sich bestens bewährt hat. Die Exstirpation der stark vergrößerten, leidlich beweglichen Milz verläuft dann außer einer schnell gestillten Blutung aus einer weit zwerchfellwärts verlaufenden accessoriischen Vene glatt. Durch engelegte, fest angezogene Nähte und einen festen Kompressionsverband gelingt es, eine stärkere Nachblutung zu verhüten. Lästig ist während der Operation das unaufhörliche

Nasenbluten. Da nach der Entfernung der Milz infolge des Operationschocks und des nicht ganz vermeidbaren Blutverlustes der Puls recht klein geworden ist, werden der Pat. von der bereitstehenden Spenderin noch während der Operation 500 ccm Blut intravenös zugeführt, worauf sich der Zustand sichtlich bessert. Noch unter der Operation nach Unterbindung der Milzgefäße kann beobachtet werden, daß die zum Zwecke einer Hb.-Bestimmung kurz vor Beginn der Operation gesetzte Stichverletzung am linken Ohr, die von der Narkose-Assistenz gleichzeitig mit der aus der Nase erfolgenden Blutung beobachtet wird, plötzlich nicht mehr blutet. Gleichzeitig scheint auch das Nasenbluten an Intensität nachzulassen und hört wenige Stunden nach der Operation völlig auf. Der Eingriff wird von der Pat. gut überstanden. Es tritt dann in langsam aufsteigender Weise eine allgemeine Besserung im subjektiven Befinden und objektiven Befund ein, sodaß die Pat. am 131. Tage nach der Aufnahme, sich gesund und kräftig fühlend, als geheilt und auch als im haematologischen Sinne als geheilt, wie wir später sehen werden, entlassen werden kann.

Von E. Frank sind die Fälle von essentieller Thrombopenie in drei Verlaufsformen eingeteilt. Danach gehört dieser Fall nach Ausschließung der akuten und rezidivierenden oder intermittierenden zu der chronischen Form. Ueber mehrere Jahre hin, nur für kurze Zeit unterbrochen nach einem besonderen ärztlichen Eingriff, erfolgen anlässlich der Periode, die für die Entwicklungsjahre mit einer genügenden Regelmäßigkeit wiederkehrt, ohne Ausnahme schwerste Blutverluste.

Diesem nun ausgesprochen chronisch verlaufenen Fall möchte ich kurz auch einen akuten Fall gegenüberstellen.

Es handelt sich um einen jungen Mann, der im Anschluß an eine Röntgenbestrahlung akut mit schwersten allgemeinen Blutungsercheinungen erkrankt. Schon nach wenigen Tagen zeigen sich auf der Haut, die anfangs übersät mit kleinsten petechialen und größeren Blutextravasaten ist, keine Spontanblutungen mehr. Das äußerst heftige Nasen- und Zahnfleischbluten hört ebenfalls auf. Nach 14 Tagen kann der Pat. als im Augenblick geheilt angesehen werden. Blutungsercheinungen haben sich seitdem — d. h. seit einem halben Jahre — nicht wieder eingestellt. Der äußeren Heilung entspricht eine Besserung des Blutbefundes, zugleich mit dem Sistieren der Blutungen setzt ein schnelles Ansteigen der Thrombocytenzahlen ein. Was nun diesen zweiten akuten Fall von dem ersten in auffallender Weise unterscheidet, ist das völlige Fehlen jeglicher Hautblutungsercheinungen bei dem ersten chronischen Falle. Von einer Blut-

fleckenkrankheit, einer Purpura haemorrhagica, einem Morbus maculosus Werlhofii kann anscheinend gar keine Rede sein; und doch handelt es sich in beiden Fällen um dieselbe Erkrankung, um dieselbe Causa morbi.

Außer den sehr schweren Menorrhagien hat die Pat. nur am ersten Tage ein Symptom einer möglicher Weise allgemeinen Blutungsbereitschaft geboten, nämlich ein leichtes Zahnfleischbluten. Aber dieses ist in den nächsten Tagen nicht wieder vermerkt und auch später nicht wieder aufgetreten. So bleibt zunächst als einziger Vorgang im Krankheitsgeschehen bei sonst in jeder Hinsicht normalem Organbefund eine Menorrhagie in cyclischer Wiederholung im Anschluß an die Periode das einzige Krankheitszeichen, eine Menorrhagie, die die Ursache einer schweren sekundären Anaemie wird.

Eine Untersuchung des Falles nach der Richtung, ob an anderen Körperteilen durch irgendeine Ursache Blutungsercheinungen provoziert werden können, bringt keinen neuen Befund. Erscheinungen, wie ich sie außer bei dem vorher erwähnten jungen Mann noch bei einer weiteren Patientin, bei der ebenfalls eine essentielle Thrombopenie Ursache einer schweren Menorrhagie geworden ist, gesehen habe, daß ein einmaliges kräftiges Drücken einer Hautfalte zwischen zwei Fingern gleich ein ausgedehntes, dem Druckbereich entsprechendes Hauthaematom hervorgerufen hat, oder daß ein mehrmaliges schnelles Reiben an der Tibiaseite des Unterschenkels zahlreiche Petechien verursacht, sind hier nie angetroffen. Auch der Frank'sche Stauungsversuch ist sogar im Sinne des Rumpel-Leede'schen Phänomens negativ geblieben: distal von der Stauung ist nicht der geringste Blutpunkt zu erspähen.

Ausdruck einer allgemeinen Neigung zu Wundbluten ist jedoch die wahrgenommene Tatsache, daß jede zum Zwecke der Hb.-Bestimmung gesetzte Stichwunde, mochte sie noch so klein sein, mochte sie am Ohrläppchen oder an der Fingerkuppe gesetzt werden, einer besonderen Wundstillung bedurft hat. Die Untersuchung des Blutbildes hat ergeben, daß es sich um eine essentielle Thrombopenie handelt, insbesondere haben die wenigen vorgefundenen Thrombocyten typische Veränderungen geboten. Ich möchte kurz in einer folgenden Uebersicht die wichtigsten haematologischen Daten folgen lassen, der in einer weiter unten gegebenen zweiten Uebersicht die Differenzierung des weißen Blutbildes an die Seite zu stellen ist:

Tabelle I.

Tag	Hb.	Erythroc.	Leukoc.	Thromboc.	Blutung
1.	26 ‰	—	—	—	Profuse Genitalblutung
2.		Abrafio in Aethernarkose			Blutung steht
10.	28 ‰	2,200,000	5,800	32,000	
12.		Beginn einer zweiten Blutungsperiode			
24.	22 ‰	1,920,000	—	17,000	Blutung unverändert
24.		Bluttransfusion von 400 ccm			<i>20</i> <i>20</i>
25.	28 ‰	—	—	—	<i>20</i> <i>20</i>
30.	26 ‰	—	—	—	<i>20</i> <i>20</i>
31.		Röntgenbefstrahlung der Milz			<i>20</i> <i>20</i>
34.	22 ‰	1,890,000	4,300	15,000	<i>20</i> <i>20</i>
36.		2. Bestrahlung der Milz			<i>20</i> <i>20</i>
37.	15 ‰	—	—	—	<i>20</i> <i>20</i>
38.		2. Bluttransfusion von 550 ccm			<i>20</i> <i>20</i>
41.	17 ‰	—	—	—	<i>20</i> <i>20</i>
42.	13 ‰	1,190,000	3,900	1,000	<i>20</i> <i>20</i>
43.		3. Bluttransfusion von 800 ccm			<i>20</i> <i>20</i>
44.	16 ‰	—	—	—	<i>20</i> <i>20</i>
		4. Bluttransfusion von 700 ccm			Uterusblutung steht
		Abrafio mit nachfolgender Jodätzung			Heftiges Nafenbluten
45.	22 ‰	—	—	—	<i>20</i> <i>20</i>
46.	20 ‰	—	—	—	<i>20</i> <i>20</i>
47.		5. Bluttransfusion von 500 ccm			<i>20</i> <i>20</i>
		Milzexstirpation			Keine Blutung mehr
48.	24 ‰	2,300,000	20,000	61,000	<i>20</i> <i>20</i> <i>20</i>
49.	22 ‰	2,200,000	25,000	52,800	<i>20</i> <i>20</i> <i>20</i>
54.	20 ‰	2,000,000	18,200	64,000	<i>20</i> <i>20</i> <i>20</i>
56.	23 ‰	2,200,000	12,000	—	<i>20</i> <i>20</i> <i>20</i>
61.	25 ‰	2,780,000	16,000	228,000	<i>20</i> <i>20</i> <i>20</i>
65.	25 ‰	2,950,000	15,000	188,000	<i>20</i> <i>20</i> <i>20</i>
70.	28 ‰	3,400,000	16,000	268,000	<i>20</i> <i>20</i> <i>20</i>
72.	31 ‰	2,670,000	13,000	149,000	<i>20</i> <i>20</i> <i>20</i>
78.	34 ‰	3,690,000	8,800	310,000	<i>20</i> <i>20</i> <i>20</i>
83.	36 ‰	3,890,000	9,800	326,700	<i>20</i> <i>20</i> <i>20</i>
91.	39 ‰	3,780,000	8,700	—	<i>20</i> <i>20</i> <i>20</i>
					88—90. geringe, an- scheinend Periodenblutung
119.	56 ‰	4,620,000	7,700	383,400	Keine Blutung
130.	57 ‰	5,140,000	5,160	326,000	119.—121. Periodenblutung?

Bei Bestimmung der Blutungs- und Gerinnungszeit ergibt sich, was Denys im Jahre 1889 bei Morbus Werlhof gefunden hat: „Das

rote und weiße Blutbild ist nicht charakteristisch verändert, die Gerinnungszeit ist nicht verzögert, dagegen sind die Blutplättchen ganz außerordentlich spärlich.“ Die Gerinnungszeit beträgt vor der Operation 5 Minuten, nach der Operation $5\frac{1}{2}$ Minuten, die Blutungszeit vor der Operation 12 Minuten, nach der Operation $1\frac{1}{2}$ Minuten. Dementsprechend ist die Diagnose einer essentiellen Thrombopenie gestellt. Uebereinstimmend besteht in allen derartigen Fällen (E. Frank, Lefschke, Klempner, B. Zondek) als augenblickliches einziges Krankheitszeichen eine lebensbedrohliche Menorrhagie. Diese Tatsache hat Halban zu der Forderung Veranlassung gegeben, daß bei länger dauernden Menorrhagien stets an einen Werlhof gedacht werden müsse, also eine Thrombocytenzählung vorgenommen werden müsse.

Die Diagnose der essentiellen Thrombopenie wird gefestigt durch Ausschließung anderer zu Blutungen führenden Krankheiten. Da es sich um ein junges Mädchen in den späteren Pubertätsjahren handelt, ist in erster Linie an eine Blutung durch Hyperplasie der Uterus-schleimhaut zu denken. Schon das erste Curettement in einem auswärtigen Krankenhause hat aber ergeben, daß eine Hyperplasie allein nicht die Ursache der Blutung sein kann. Differentialdiagnostisch sind, wie oben erwähnt, auch andere Erkrankungen des Gentiale ausgeschlossen worden. Zu erwägen sind dann weitere Allgemeinerkrankungen, bei denen zuweilen Blutungen gesehen werden:

a) Ein Skorbut ist dadurch ausgeschlossen, daß die Pat. gleich von Anfang an eine vitaminreiche Kost erhalten hat. Auffällig ist nämlich gewesen, daß die Pat. eine akute Verschlimmerung ihrer Menorrhagien erfahren hat, nachdem sie aus ihrer Heimat, einem kleinen Harzstädtchen, in einen Stadtteil Hamburgs gezogen ist, in dem besonders häufig Avitaminosen angetroffen werden. Trotz der besonderen Diät ist eine Aenderung in der Blutung nicht eingetreten.

b) Es ist dann bisweilen eine haemorrhagische Diathese bei Endokarditis lenta erwähnt worden. Dafür hat in diesem Falle angeführt werden können der Milztumor, ein einmaliger Befund von Erythrocyten im Katheter-Urin, ein systolisches Geräusch über dem Herzen und leichte Temperaturschwankungen. Es sind daher Blutkulturen angelegt, die Untersuchungen haben aber ein negatives Ergebnis gezeitigt.

Eine besondere Abgrenzung des Krankheitsbildes der Thrombopenie hat dann noch zu erfolgen gegen andere Erkrankungen des haematopoetischen Systems, insbesondere Erkrankungen mit haemorrhagischer Diathese, ferner gegen andere Splenomegalien.

c) Anaemia perniciosa: Einen einschlägigen Fall von perniciosöser Anaemie mit tödlichen Menstrualblutungen hat vor kurzem F l e i s c h-

mann in der „Wiener gynäkologischen Gesellschaft“ beschrieben. Der Blutstatus der Pat. mit einem Färbeindex von 0,55 machte diese Erkrankung schon gleich unwahrscheinlich. Weiter ist auch im gefärbten Ausstrich kein Anhaltspunkt für einen Morbus Biermer zu gewinnen. Es sind keine embryonalen Formen von roten Blutkörperchen vorhanden. Die Differenzierung der einzelnen Erythrocyten ergibt eine Linksverschiebung des roten Blutbildes: Es sind kleine haemoglobinarmer und unregelmäßig gestaltete rote Blutkörperchen vorhanden, die ganz im Gegensatz stehen zu einem Blutbilde bei einer Perniciosa, das auffällig große haemoglobinreiche Erythrocyten aufweist.

d) Haemophilie: Ein voll beweiskräftiger Fall einer weiblichen Haemophilie ist nach Frank und Halban bisher nicht gesehen worden. Die Bestimmung der Daten für Blutungs- und Gerinnungszeit haben sie völlig ausschließen lassen.

e) Akute Leukämie, akute Aleukie und aplastische Anaemie sind durch den Blutstatus ausgeschlossen worden. Die wesentliche Verminderung der Erythrocyten ist nicht zu erklären durch ein Versagen des erythropoetischen Systems, sondern nur durch die hohen Blutverluste.

f) Die Anstellung eines Resistenzversuches der roten Blutkörperchen hat dann weiterhin einen haemolytischen Ikterus unwahrscheinlich gemacht. Haemolyse ist bei einer hypotonischen Lösung von 0,48 eingetreten. Im Blutserum und im Urin sind keine Blutzerfallsprodukte nachgewiesen. Ein Ikters ist nicht vorhanden.

g) Handeln hat es sich auch nicht um die selten gefundene Fibrinopenie können. Die Beobachtung der normal einsetzenden Gerinnung — bei der Fibrinopenie ist die Gerinnungszeit durch das Fehlen von Fibrinogen eine unendliche — hat sie ausgeschlossen.

h) Zu erwägen ist endlich ein Morbus Banti gewesen. Es hätte sich um einen beginnenden Fall mit solitärer Milzvergrößerung handeln können. Eine Erklärung der Menorrhagien wäre jedoch dadurch nicht gegeben.

Die Diagnose der essentiellen Thrombopenie erfolgt jedoch nicht so sehr durch Ausschluß anderer, Menorrhagien verursachenden, Erkrankungen, sondern in erster Linie durch den Nachweis des Fehlens der Thrombocyten im peripheren Blute.

Nach den Ausführungen von E. Frank, die im Schittenhelm'schen Handbuch der Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe niedergelegt sind, ist das Defizit der Blutplättchen allein eine genügende Erklärung für sämtliche bei der Thrombopenie gesehenen Spontan- und Wundblutungen. Er hat in jetzt allgemein

anerkannter Weise abgelehnt, daß außerdem eine Gefäßwandschädigung bestehen muß. Der kritische Wert der Thrombocyten, unter dem es zu Blutungsercheinungen kommen kann, ist von ihm mit 35,000 angegeben. Dieser Wert hat in unserem Falle eine Bestätigung gefunden, die Thrombocytenzahlen haben bei ihm unterhalb dieser Grenze gelegen.

Umsritten ist aber auch heute noch die Aetiologie der Thrombopenie. K a z n e l s o n, der 1917 die erste Splenektomie bei Werlhof gewagt hat, die schon damals für die Behandlung der perniciösen Anaemie und des haemolytischen Ikterus angegeben war, hat die These der splenogenen Thrombopenie aufgestellt. Dem widersprechen jedoch die verschiedentlichen Mißerfolge nach einer Milzexstirpation, wie sie in neuerer Zeit auch von W i e n k h a u s und B. Z o n d e k wieder bekannt gegeben sind. Wohl ist in dem einen Falle nach dem operativen Eingriff eine Steigerung der Thrombocytenwerte und eine Besserung der Blutungszeit eingetreten, die Blutungsercheinungen sind aber unverändert geblieben. Im Zondeck'schen Falle einer lebensbedrohlichen Menorrhagie ist nach einem 4½-jährigen Intervall von Blutungsfreiheit nach der Operation eine neue lebensbedrohliche Blutung aufgetreten. Es ist daher von F r a n k die rein splenogene Theorie abgelehnt worden und, nachdem S e e l i g e r typische Knochenmarksveränderungen autoptisch festgestellt hat, in jetzt allgemein anerkannter Weise eine primäre Schädigung des Knochenmarks, eine Megakariotoxykose, als Ursache des Fehlens der Thrombocyten im strömenden Blut angeschuldigt worden.

Der überraschende Erfolg der Milzexstirpation in bezug auf die Blutungen und das Ansteigen der Blutplättchen wird von F r a n k als Knochenmarksreizung angesprochen, wie sie in leichten Fällen durch intramuskuläre Blutinjektion oder durch Proteinkörpertherapie erzielt werden kann.

Die Knochenmarkschädigung, wie sie autoptisch von Seeliger niedergelegt worden ist, hat experimentell durch Schüler Franks durch Peptoninfusionen, Benzolvergiftungen und hohe Röntgenbestrahlungen des Knochenmarks erzielt werden können.

Eine Knochenmarksreizung ist auch in unserem Falle nach der Operation in hervorragendem Maße aufgedeckt. Die in der nun folgenden Aufstellung gegebenen Leukocytenzahlen und Differenzierungen des weißen Blutbildes geben eine sofort nach der Operation einsetzende ausgesprochene Vermehrung der relativen und absoluten Granulocytenwerte wieder, die zurückgeführt werden muß auf eine gesteigerte spontane Tätigkeit des Knochenmarks. Analog finden sich im roten Blutbilde als Ausdruck einer enorm gesteigerten Knochenmarksfunktion und -reaktion zahlreiche Normoblasten, von de-

nen in jedem Gesichtsfeld mehrere angetroffen sind, vereinzelt Jollykörperchen und ein Emporfschnellen der vitalgranulierten Erythrocyten, alles Erscheinungen, wie sie vor der Operation vermißt sind. Wie bei den Leukocyten und Erythrocyten eine gewaltige Steigerung der Knochenmarkstätigkeit zu erblicken war, so hat auch das dritte Formelelement des Blutes (Blutplättchen) einen rapiden Anstieg der Werte gezeigt.

Tabelle II.

Absolute Zahlen und Differenzierung der Leukocyten

Tag	Gesamtzahl	Eosin.	Jugdl.	Stabk.	Segmtkg.	Lymph.	Monoc.
10.	5.800	4 %	2 %	8 %	61 %	23 %	2 %
Nach einer Bluttransfusion und der ersten Milzbestrahlung							
34.	4.300	—	4 %	20 %	56 %	18 %	1 %
Am zweiten Tage nach der Milzexstirpation:							
49.	25.000	—	6 %	2 %	92 %	—	—
54.	18.200	3 %	1 %	3 %	86 %	2 %	5 %
56.	12.000	0,5 %	9,5 %	4 %	80,5 %	5 %	0,5 %
61.	16.000	—	4,5 %	4,5 %	80,5 %	3,5 %	2 %
65.	15.000	0,5 %	5 %	7 %	79 %	5,5 %	3 %
68.	15.200	0,5 %	3,5 %	3,5 %	78,5 %	12 %	1,5 %
76.	13.800	—	—	5 %	68,5 %	10 %	16,5 %
83.	9.800	—	—	2 %	66 %	9 %	23 %
86.	7.200	—	1 %	1 %	58 %	20 %	20 %
91.	8.700	—	—	1 %	63,5 %	16 %	19,5 %
96.	7.280	0,5 %	—	3 %	55 %	25,5 %	16 %
103.	7.280	1,5 %	—	1 %	52,5 %	23,5 %	21,5 %
113.	6.040	2 %	—	2 %	62 %	23 %	11 %
119.	7.790	1,5 %	—	4 %	53 %	30 %	11,5 %
130.	5.160	1 %	—	2 %	50 %	35 %	12 %

Zweifel an einer reinen Knochenmarkschädigung hätten uns aufkommen können bei der Untersuchung der exstirpierten Milz. Das Gewicht derselben ist gegenüber der Norm um das Dreifache erhöht gewesen: 425 gr — normal 120—150 gr. Milzmasse $15 \times 12 \times 7,5$. Die mikroskopische Untersuchung der Milz hat eine abnorm gestei-
 gerte Erythrophagocytose aufgedeckt in eigenartig länglich gestal-
 teten Reticulo-Endothelzellen, ferner cystisch erweiterte Milzsinus, die
 mit Erythrocyten und Thrombocyten angefüllt sind. In den Aus-
 strichen der Milz ist die Plättchenzahl wesentlich größer als es dem

Blutgehalt der Milz entsprochen hätte, außerdem findet sich im Vergleich mit den Thrombocytenwerten des peripheren Blutes eine relative Anhäufung von Thrombocyten in der Milz.

F r a n k hat einen ähnlichen Milzbefund ebenfalls auf Knochenmarkschädigungen zurückgeführt: „Die Thrombocyten sind ebenso wie die Erythrocyten und die granulierten Leukocyten Blutelemente, deren Wiege im Knochenmark steht, deren Grabstätte die Milz ist.“ Das würde hier heißen, daß die Milz die bei der essentiellen Thrombopenie mangelhaft gebildeten Thrombocyten und lebensuntüchtigen Blutplättchen, die schon normalerweise nur eine beschränkte Lebensdauer von 4—5 Tagen haben, kurz nach ihrer Einschwemmung ins Blut zurückhält und zerstört. Die Menorrhagien bei essentieller Thrombopenie finden ihre Erklärung in der verlängerten Blutungszeit. Nach S e i t z wird beim periodischen Umbau der Uterus Schleimhaut eine temporäre Wundfläche mit arrodieren Gefäßen geschaffen, es ist daher beim Werlhof eine besonders starke Blutung zu erwarten, da die Stillung von Wundblutungen infolge Fehlens der Thrombocyten vom Organismus viel schwieriger besorgt werden kann als normal.

Bei einem Vergleich der Alterszahlen im Auftreten der essentiellen Thrombopenie fällt es auf, daß es sich besonders häufig um junge Mädchen zurzeit der Pubertät handelt. Es ist daher an eine schon vor der Geburt erworbene Noxe zu denken. Ähnlich wie bei der genuinen Epilepsie es sich um eine zurzeit der Pubertät manifest werdende Diathese handelt, wäre auch hier an ein zur selben Zeit Manifestwerden einer bis dahin latent gebliebenen Diathese zu denken.

Z u s a m m e n f a s s u n g.

Es handelt sich um einen Fall von essentieller Thrombopenie, bei dem im Vordergrund der Erscheinungen die Menorrhagie gestanden hat. Durch eine Milzexstirpation ist Heilung erzielt worden, die bis jetzt, d. h. zwei Jahre nach der Operation, angehalten hat.

Die Beobachtung der Blutbefunde ergibt, daß eine Knochenmarkschädigung in hervorragendem Maße an der Erkrankung beteiligt gewesen sein muß.

Daß außer der bestehenden Thrombopenie eine Gefäßwandschädigung vorgelegen hat, ist ausgeschlossen.

Literatur.

Naegeli: Blutkrankheiten und Blutdiagnostik.

Leischke: D. m. W., 1925, S. 1352.

Weibel, Lebensgefährliche funktionelle Uterusblutungen und ihre Behandlung. Medizinische Klinik, 1931.

Halban-Seitz: Biologie und Pathologie des Weibes.

Schittenhelm: Handbuch der Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe.

Schmincke: Münchener med. Wochenschrift, 1926. Pathologische Demonstration eines Falles von essentieller Thrombopenie.

Klemperer: Zeitschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie, Bd. 35. Menorrhagien aus Thrombopenie.

Stern und Hartmann: Klinische Wochenschrift, 1928. Ueber die Merkmale seltener Bluterkrankungen: Agranulocytose, Panmyelophthie, essentielle Thrombopenie.

Anschütz: Milzexstirpation bei essentieller Thrombopenie. Medizinische Gesellschaft zu Kiel. Münchener und Wochenschr., 1927.

Decastello: Empirik und Theorie der modernen Behandlungsmethoden bei Erkrankungen d. haematopoetischen Systems. Med. Klin. 1931.

B. Zondek: Lebensbedrohliche thrombopenische Uterusblutung. Zentralbl. f. Gynäkologie, 1931.

Lebenslauf.

Als Sohn des Amtsphysikus, San.-Rat Dr. Bulle und seiner Ehefrau Anna, geb. Rüther, wurde ich, Heinz Bulle, am 20. Dezember 1903 zu Cuxhaven geboren. Nach 3jährigem Besuch der Vorschule Cuxhaven-Abendrothstraße, trat ich Ostern 1913 in die höhere Staatschule (Gymnasialabteilung) zu Cuxhaven ein, an der ich 1923 die Reifeprüfung bestand. In zehnfemestrigem Studium unter einsemestriger Unterbrechung studierte ich dann Medizin an den Universitäten Göttingen, Freiburg, Jena und Hamburg. Ostern 1925 bestand ich die ärztliche Vorprüfung zu Göttingen und im Mai 1929 die ärztliche Prüfung zu Hamburg. Die ersten 6 Monate meines praktischen Jahres arbeitete ich an der Universitätsfrauenklinik Hamburg-Eppendorf (Prof. Dr. Th. Heinemann). Die zweite Hälfte des praktischen Jahres bis Mitte Mai 1930 war ich dann auf der Direktorialabteilung des Eppendorfer Krankenhauses (Dir. Prof. Dr. L. Brauer) tätig. Nach meiner Approbation am 17. Mai 1931 war ich dann als Aushilfsassistent am Eppendorfer Krankenhaus beschäftigt, zuerst unter Herrn Prof. Brauer auf der I. med. Abteilung, ab 1. Januar 1931 unter Herrn Prof. Schottmüller auf der III. med. Abteilung. Am 1. Juli 1931 habe ich mich als praktischer Arzt in Cuxhaven niedergelassen.

